

LATIGO PASTA

CEBO RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN FORMA DE PASTA FRESCA		
COMPOSICIÓN 0.0029% BRODIFACOUM	Registro Oficial ES/MR(NA)-2018-14-00492	FORMULACIÓN CEBO FRESCO
		
PLAGAS DIANA	RATAS y RATONES	
MODO DE EMPLEO	LISTO USO. APLICACIÓN EN PORTACEBOS DE SEGURIDAD.	
EMBALAJE UD/CAJA	50 UD / 150 gr (7.5 kg/caja)	
USO PÚBLICO EN GENERAL		

MODO DE ACCIÓN

LATIGO PASTA es un cebo rodenticida a base de Brodifacoum, formulado como pasta fresca. Se trata de un cebo muy apetente y palatable en presencia de otros alimentos deseados por los roedores como pienso, cereales o harinas. Por su frescura, es altamente eficaz en ambientes secos, donde el roedor buscará fuentes de agua. Es además seguro en su aplicación, al presentar una menor toxicidad en otros mamíferos no objetivo que otros anticoagulantes.

El Brodifacoum es un rodenticida anticoagulante de segunda generación derivado de la cumarina. Dentro de esta familia es el más activo que se conoce. El Brodifacoum reduce la capacidad de coagulación de la sangre (factores II, VII, IX y X) por inhibición de la protrombina y bloqueo de la reductasa en el ciclo de la vitamina K1-epóxido. Controla eficazmente a los roedores resistentes a los anticoagulantes de primera generación (warfarina y cumatetralilo).

En oposición a otros anticoagulantes menos activos, una dosis letal de Brodifacoum puede ser ingerida con una sola toma de cebo. Esto lo hace particularmente interesante para el control de ratones, que se caracterizan por ingerir pequeñas cantidades de alimentos procedentes de fuentes diversas.

MODO DE EMPLEO

El producto se puede utilizar tanto en interiores como alrededor de las edificaciones.

Antes de utilizar **LATIGO PASTA** es necesario inspeccionar detenidamente la zona de infestación para localizar las zonas de paso y las madrigueras.

Una vez determinados los lugares donde se situará el cebo, éste se colocará protegido en portacebos para evitar que lo encuentren otros animales y facilitar que lo ingiera el roedor.

Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir. Es recomendable no tocar el cebo con las manos para evitar que los animales desconfíen al percibir su olor (utilizar guantes en la manipulación del producto).

Se deberá reponer los cebos consumidos o deteriorados y reemplazar o rellenar los que hayan sido consumidos por los roedores, dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de cebo hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se observará porque el cebo permanece intacto.

DOSIFICACIÓN

Ratones: 50 gramos de cebo (3-4 bolsitas) por punto de cebo cada 2 metros (alta infestación) o cada 5 metros (baja infestación). Los portacebos deben revisarse al menos cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.

Ratas: 90 gramos (6 bolsitas) de cebo punto de cebo cada 5 metros (alta infestación) o cada 10 metros (baja infestación). Los portacebos deben revisarse a los 5-7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.