



# Ampligo<sup>®</sup>

**La mejor solución contra la polilla guatemalteca**



## Ampligo<sup>®</sup>

**syngenta<sup>®</sup>**

© 2018 Syngenta. Todos los derechos reservados. <sup>™</sup> y <sup>®</sup> son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

**Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.**



## Nueva solución para combatir más eficazmente la polilla de la papa.

**Ampligo** es un insecticida en forma de concentrado en suspensión (**ZC**), compuesto de Clorantraniliprol (100 g/l) y Lambda cihalotrin (50 g/l).

La **Formulación ZC** es novedosa en el mercado, una mezcla de **CS** (suspensión de microcápsulas) y **SC** (suspensión concentrada) de consistencia comprobada y que integra las ventajas de ambas formulaciones y sustancias activas para conseguir una elevada eficacia.

### Modo dual y eficaz de acción para el control de plagas


**Ampligo** es un producto único en el mercado, de alta eficacia para el control de las plagas de alto impacto económico que afectan a la papa.

Presenta dos materias activas con modos de acción diferentes (dual) y complementarios con alta eficacia para la polilla de la papa y otras orugas como Tuta Absoluta, Plusia y Heliothis.

La actuación complementaria de ambas materias produce una parálisis de las larvas de la polilla en todos sus estadios de desarrollo, cesando su alimentación a las pocas horas de entrar en contacto con el producto y posteriormente produciendo su muerte, evitando que se produzcan daños en el cultivo. Al mismo tiempo la acción de choque sobre los adultos de la polilla reduce drásticamente su población evitando sus puestas.


Además, al combinar una alta eficacia ovilarvicida y control de adultos al mismo tiempo, se disminuye el número de puestas y se reduce la viabilidad de la eclosión de los huevos, lo que se traduce en un consistente control de la plaga.

### Control de todos los estadios de desarrollo



### Control sobre *Tecia Solanivora*

% área dañada por Tecia - 100 tubérculos



### Eficacia sobre la polilla de la papa


La polilla de la papa hace sus puestas en el terreno antes de que se levante el cultivo quedando los tubérculos contaminados por sus huevos que eclosionarán en el momento de almacenaje de los mismos. Por lo tanto, es vital controlar esta plaga mediante la interrupción de las puestas sobre los 14-21 días antes de la cosecha, para lo que una correcta identificación y seguimiento de la curva de vuelo de la polilla es esencial para garantizar un correcto tratamiento.

## El ciclo de vida de la polilla

El ciclo completo de *Tecia solanivora* puede durar entre 40 y 95 días dependiendo de las condiciones de temperatura. Una sola puesta puede contener entre 150 y 360 huevos que son depositados en las grietas del suelo cerca de la base del tallo de la planta, hojas bajas o en los tubérculos mal cubiertos, y durante el almacenamiento de las papas sobre superficies que presentan depresiones.

Transcurridos 10-15 días, el 80-95% de los huevos eclosionarán y las larvas emigrarán al tubérculo para alimentarse, causando daños inicialmente en la superficie de la papa, pudiendo llegar a destruirla en su totalidad. Al final del desarrollo larvario, abandonan el tubérculo y forman una pupa o crisálida en los primeros 5 cm del suelo y finalmente transcurridas unas semanas de metamorfosis, saldrá el adulto.

El insecto adulto es volador, y son más activos durante el atardecer, la noche y el amanecer. La oscuridad de los lugares de almacenamiento favorece la actividad del adulto. Durante el día están refugiados en sitios oscuros, en el almacén en el tubérculo y en el campo en el suelo. Hendiduras en suelo o paredes del almacén o en el suelo de los terrenos facilitan su desarrollo, por eso el daño es superior en condiciones ambientales secas o durante el mes anterior a la cosecha por las grietas provocadas al crecer el tubérculo dentro de la tierra.



## Recomendaciones de uso en la papa

| Plagas                                                   | Dosis    | Nº máximo de aplicaciones | PS (días) |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Polillas de la papa ( <i>Tecia Solanivora</i> y otras..) | 30 ml/hl | máximo 300 ml/ha          | 14 días   |

## Momento de aplicación

Se aplicará el producto de forma preventiva desde la detección de vuelo de adultos de polilla utilizando trampas. Se recomienda dar dos tratamientos con intervalo de 8 a 10 días entre aplicaciones.



<https://www.syngenta.es/good-growth-plan>



**Syngenta España S.A.U.**  
C/ Ribera del Loira 8-10  
28042 Madrid  
[www.syngenta.es](http://www.syngenta.es)