

TurboShield®

Doble Barrera Activa para la higiene y protección del pezón después del ordeño

- ▲ Excelente desinfección con **Bioxidium®**
- ▲ Barrera física y química que protege el pezón entre ordeños
- ▲ Activo para dos ordeños
- ▲ Buena visibilidad sobre el pezón



APLICACIÓN

TurboShield® se obtiene mezclando a partes iguales (50/50) **TurboShield® Base** (rojo) y **TurboShield® Activator** (incoloro). Después del ordeño, aplicar por inmersión **TurboShield®** en el pezón.

No retirar el producto tras su aplicación. Antes del siguiente ordeño retirar los restos de **TurboShield®** utilizando un producto ECOLAB para antes del ordeño en espuma, papel desechable o toallitas.



CARACTERÍSTICAS

El **Bioxidium®** garantiza una rápida y potente desinfección frente a un amplio espectro de microorganismos patógenos. El **Bioxidium®** contiene dióxido de cloro, sustancia activa notificada en la Directiva sobre Biocidas 98/8/EC para la higiene veterinaria.



Como una segunda piel, la barrera de **TurboShield®** protege el pezón tras el ordeño de los patógenos presentes en el ambiente. Fácil de eliminar con las soluciones de Ecolab para el pre-ordeño o con papel monouso.

BENEFICIOS

TurboShield® desinfecta el pezón pudiéndose incluir en el programa global de lucha contra los patógenos causantes de mamitis.

TurboShield® protege el pezón gracias a la barrera física y química.

TurboShield® garantiza la desinfección y la protección en condiciones ambientales adversas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

TurboShield® Base	
Aspecto	Líquido
Color	Rojo
Composición	Acido Láctico
Olor	Típico
pH	2,75 ± 0,25
Temperatura de almacenamiento	0-30°C

TurboShield® Activator	
Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Composición	Clorito Sódico
Olor	Inodoro
pH	8,5 ± 1,0
Temperatura de almacenamiento	0-30°C

PREPARACIÓN Y EMPLEO DE TurboShield®

TurboShield® se obtiene mezclando a partes iguales (50/50) **TurboShield® Base** (rojo) y **TurboShield® Activator** (incoloro). Antes del ordeño, preparar la mezcla en el vaso del aplicador. Cierre el aplicador girando la tapa. Agitar horizontalmente el aplicador para garantizar un buen mezclado. Esperar al menos dos minutos hasta que la mezcla sea activa: el color cambia de rojo a amarillo. Por presiones sucesivas enviar el producto desde el vaso a la copa del aplicador hasta que ésta esté completamente llena. Después del ordeño, sumergir el pezón en la copa del aplicador. Evitar que el animal se tumbe inmediatamente después del ordeño. La mezcla se puede utilizar durante dos ordeños y debe ser renovada después de 14 horas.



CÓMO APLICAR TurboShield®

El **Bioxidium®** es un principio activo muy potente, por tanto **TurboShield®** pudiera provocar pequeñas irritaciones en el pezón del animal durante los primeros días de uso.

Protocolo para la primera semana de uso de **TurboShield®**:

- Ganaderías que ya usan productos a base de dióxido de cloro:
 - aplicar **TurboShield®** después del ordeño, reemplazando totalmente el producto utilizado con anterioridad.
- Ganaderías que no hacen post-dipping o utilizan productos que no contienen dióxido de cloro:
 - Primera y segunda semanas: alternar el uso de **TurboShield®** con el producto que se ha usado anteriormente o utilizar Velucid®.
 - Desde la tercera semana: aplicar **TurboShield®** como producto habitual.

